


♀ Frauen

Behandlung mit Tenofovirdisoproxil

Abschätzung der Kreatinin-Clearance aus der Serum-Kreatinin-Konzentration



Beispiel: 60 kg schwere Frau, 40 Jahre alt, Serumkreatinin 2,0 mg/dl
 Vorgehen: Stelle unter ① Gewicht 60 kg das ② Alter 40 Jahre; ohne weitere Verschiebung kann nun unter ③ Serumkreatinin bei 2,0 mg/dl die ④ Kreatinin-Clearance von 36 ml/min abgelesen werden.


Kreatinin-Clearance < 50 ml/min: Dosisreduktion, Normaldosis 245 mg Tenofovir

*Quelle: Modifiziert nach Parmar MS: Chronic renal disease. BMJ 2002; 325:85-90

♂ Männer

Behandlung mit Tenofovirdisoproxil

Abschätzung der Kreatinin-Clearance aus der Serum-Kreatinin-Konzentration



Beispiel: 60 kg schwerer Mann, 40 Jahre alt, Serumkreatinin 2,0 mg/dl
 Vorgehen: Stelle unter ① Gewicht 60 kg das ② Alter 40 Jahre; ohne weitere Verschiebung kann nun unter ③ Serumkreatinin bei 2,0 mg/dl die ④ Kreatinin-Clearance von 42 ml/min abgelesen werden.

Kreatinin-Clearance < 50 ml/min: Dosisreduktion, Normaldosis 245 mg Tenofovir

*Quelle: Modifiziert nach Parmar MS: Chronic renal disease. BMJ 2002; 325:85-90